

Po zabiegu

Okres do kilkunastu godzin po znieczuleniu i zabiegu chirurgicznym to czas potrzebny na powrót do pełnej sprawności ruchowej i psychicznej zwierzęcia.

Zastosowanie się do poniżej przedstawionych zaleceń i uwag oraz dozór zwierzęcia pomoże Państwu uniknąć problemów i zapewnić mu właściwą opiekę.

- Wydajemy w pełni wybudzonego pacjenta jednak po znieczuleniu jeszcze przez kilkanaście godzin zwierzę może mieć lekkie drżenia mięśniowe, zataczać się, mimowolnie oddawać mocz. Może wystąpić przejściowa nadwrażliwość na światło, dźwięki, dotyk manifestująca się wyciem, skomleniem, miażdżeniem. Zwierzę może również być senne do kilkunastu godzin po znieczuleniu.
- Po kilku godzinach zwierzę można napoić niewielką ilością wody i jeśli nie zwymiotuje, po 2-3 godzinach podać niewielką ilość lekkostrawnej, półpłynnej karmy. Jeśli zwymiotuje to nie karmimy.
- **Nie podajemy suchej karmy w ciągu 24 godzin od zabiegu!**
- **Zwierzę otrzymało po zabiegu niezbędne leki i środki przeciwbólowe.** Oczy ma zabezpieczone przed wysychaniem specjalnym żelem, ma pozostawiony i zabezpieczony dostęp do żyły (wenflon). Do skóry w miejscu rany pooperacyjnej przymocowany jest opatrunek.
- **Nie wolno zwierzęciu samowolnie podawać jakichkolwiek leków!**
- **Ranę pooperacyjną należy chronić przed lizaniem przez zwierzę i zabrudzeniem poprzez założenie specjalnego kołnierza lub/i kubraczka (do nabycia w przychodni) czasem też kagańca .**
- Następnego dnia należy przyjść ze zwierzęciem do kontroli, stosować się do wszelkich zaleceń lekarza prowadzącego, pytać o wszystko, co budzi niepokój lub jest niejasne.
- Szwy skórne zdejmujemy zwykle po 7-14 dniach. Szwy wewnętrzne wchłaniają się po jakimś czasie co może powodować nieznaczny obrzęk okolicy pooperacyjnej utrzymujący się do miesiąca czasu.